



← Parietaire

SAUVAGES

DE NOS RUES

Quand le vert réinvestit nos rues



← Nombriil de Vénus



Doradille →

← Laiteron



# ÉDITO

Depuis l'arrêt de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les espaces communaux, le paysage urbain se modifie progressivement avec l'apparition d'espèces végétales naturelles. Un véritable défi pour les communes, qui doivent aujourd'hui penser différemment et adapter leurs aménagements. Souvent considérées comme « mauvaises herbes », comme « sales », c'est oublier un peu vite le fonctionnement du monde végétal et tout ce que ces plantes ont à nous apporter. La nature ayant horreur du vide, ces espèces nous prouvent chaque jour leur capacité à se développer et à créer de véritables petits écosystèmes sur des surfaces parfois surprenantes. Des usages oubliés (médicinal, culinaire) aux intérêts pour la faune, ce guide est là pour vous les présenter. Et apprendre à les connaître, c'est apprendre à les accepter !

Ressources ethnobotaniques : Florence Creac'hcadec  
Illustrations et maquettage : Anna Duval Guennoc  
Photographie : Dan Cristian Paduret (Site Pexels)

## Le saviez-vous ?

- Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019, l'usage des produits phytosanitaires est interdit aux particuliers afin de protéger l'eau, la biodiversité et la santé.
- **Vinaigre ? Gros sel ? Fausse bonne idée !**  
Interdits, ils tuent toute vie microbologique du sol. Seules les plantes ultra-résistantes se développeront alors (chardons, rumex...).

## Légende



Origine



Milieux



Usages médicaux  
et alimentaires



Attention danger

*En cas de doute sur l'identification d'une plante, nous vous conseillons de ne pas la consommer.*

# PIEDS DE MURS

## ET MURETS

Valériane rouge  
Lilas d'Espagne

*Centranthus ruber*

**Belier-moger-ruz**

(Caprifoliacées)



Bassin méditerranéen



Plante ornementale cultivée dans les jardins.  
Terrains calcaires (murs des villes et bourgs)  
et milieux chauds.



Feuilles riches en vitamine C. Elles se  
consomment en salade, surtout en Italie.  
La racine a la même odeur et les mêmes  
vertus tranquillisantes que celles de la  
valériane officinale.



## Pariétaire de Judée

*Parietaria judaica*

**Torr-moguer**

(Urticacées)



Régions méridionales



Pieds de murs, pierres de village, fossés des chemins et des routes en milieu calcaire.



Les feuilles de « l'Épinard des murs » soignent les affections des voies urinaires. Les jeunes pousses avant floraison se consomment crues en salade, cuites en soupes ou en gratins.



Le pollen de ces fleurs peut être très allergisant.



*Ruine de Rome*, *Cymbalaria muralis*  
Lin-ar-mogeriou, (Plantaginacées)



Régions méditerranéennes



Vieux murs, galets littoraux, rochers, milieux calcaires. Cette espèce peut densément et rapidement tapisser un muret : sitôt décolorées, les fleurs recherchent l'ombre en se recourbant vers les interstices sombres des pierres pour que le fruit puisse mûrir.

*Pâquerette des murailles*

*Erigeron karvinskianus*  
(Astéracées)



Mexique et Amérique Centrale



Interstices des murs et des trottoirs en ville et dans les bourgs.

Plante ornementale très cultivée dans les jardins.

Dès 1850, date de son introduction, elle s'échappe des jardins pour coloniser les murs et les rochers. Elle ne se mélange pas à la flore indigène en dehors de ces milieux (plante subspontanée).



## Capillaire des murailles

*Asplenium trichomanes*

**Raden-moguerioù**, (Aspleniacées)



Europe



Vieux murs ombragés et semi-ombragés, puits.



En grec, *asplenium* se traduit par « remède pour la rate ».

À Ouessant, sa présence dans les puits et fontaines était considérée comme un signe de bonne santé de l'eau.



## Doradille noire

*Asplenium adiantum-nigrum*

**Raden-moguer**

(Aspleniacées)



Régions océaniques européennes




Vieux murs, rochers, ruines, puits, talus, chemins creux, haies.



Autrefois utilisée contre les affections bronchiques et pulmonaires légères.

Attention, la plupart des fougères sont toxiques pour l'humain !



### Polypode du chêne

*Polypodium interjectum*

**Raden-dero**, (Polypodiacées)



Une des deux espèces européennes d'un genre qui compte 300 espèces dans le monde.



Vieux murs et rochers ensoleillés des villages. Parfois épiphyte (se fixe sur une autre plante sans être parasite).



Racine laxative, cholagogue (facilite l'évacuation de la bile), employée pour soigner la jaunisse, la constipation chronique et l'insuffisance hépatique.



## Nombriil de Vénus

*Umbilicus rupestris*

**Krampouezh-mouezig, Tule, Kokerlu**  
(Crassulacées)



Régions méridionales



Vieux murs, rochers, ruines,  
talus ombragés et humides.



LA plante médicinale bretonne par excellence !  
Vertus dermatologiques en application directe  
contre les brûlures, abcès, coupures...  
Se consomme en salade de l'hiver au printemps.

## Scolopendre, Langue de cerf

*Asplenium scolopendrium*

**Teod-karv**  
(Aspléniacées)



Europe



Rocailles calcaires humides, forêts de ravins,  
chemins creux, bords de ruisseaux, cascades,  
vieux murs, puits.



Les frondes (feuilles de fougères) ont été  
utilisées pour leurs vertus adoucissantes et  
calmantes des voies respiratoires.





BORDS DE CHEMINS

DE ROUTES

ET TROTTOIRS

Vergerettes, *Conyza* ssp.

Bozen-ki, (Astéracées)



Amérique du Nord et Amérique du Sud.  
Introduites en Europe accidentellement au 17<sup>ème</sup> siècle.



Bords des chemins et routes, trottoirs, voies ferrées,  
terrains vagues, cultures.



Utilisée pour soulager les maux d'estomac, les douleurs  
articulaires, pour stopper les hémorragies et les diarrhées  
par les peuples racines d'Amérique du Nord.



Plusieurs espèces de vergerettes se confondent :  
*C. canadensis*, *C. floribunda*, *C. sumatrensis*, *C bonariensis*.  
La vergerette du Canada (*C. canadensis*) est plus claire  
et a des capitules plus petits (2 à 5 mm).

Détail des fleurs  
et graines

Jeune Vergerette



Pissenlit, Dent-de-lion, *Taraxacum* spp.  
C'hwervizon, Louzaouen ar stouter, c'hwelien  
(Astéracées)



Vraisemblablement européenne. Prairies naturelles des plaines, des montagnes et des vallées alluviales.



Prairies agricoles, cultures, vergers, jardins, bords de chemins et des routes, terrains vagues.



Plante entière comestible crue ou cuite. Grande plante nettoyante de l'organisme (foie, reins, peau).



*Porcelle enracinée, Hypochaeris radicata*

**Lez koat, Askol du, Tuoc'h**

(Astéracées)



Europe, Maghreb, Proche Orient



Bords de routes et de chemins, terrains vagues, prairies agricoles, pelouses. Une forte présence indique un sol acide et compacté.



Feuilles comestibles crues ou cuites avant floraison. Possède les mêmes vertus que le pissenlit, en moins amère.



*Laiteron maraîcher*

*Sonchus oleraceus*

**Askol laezheg, Lezegenn, Lez gwez**

(Astéracées)



Europe



Plante nitrophile (aime les terrains riches en azote) de jardins potagers, bord de chemins et des routes, terrains vagues.



Les jeunes feuilles se consomment crues en salade.

À la Réunion et Madagascar, plantes cuites en épinards avant ou en début de floraison (léger goût d'artichaut), préparation traditionnelle connue sous le nom de « Brède Lastron ».



## Géranium robert

*Geranium robertianum*

**Spilhoù ar goukoug, Nadoziòù**

(Géraniacées)




Europe, Asie, Amérique du Nord



Bords de chemins, pieds de murs, autour des maisons, haies. Plante très commune.



Les feuilles, riches en tanins, sont cicatrisantes et s'utilisent en pansement d'urgence. En tisane et gargarisme, elles soulagent les inflammations de la gorge et de la bouche (abcès, gingivites, aphtes, angines).



## Flouvé odorante, *Anthoxanthum odoratum*

**Geot c'hwezh vat, Flouven,** (Poacées)



Prairies naturelles des grandes vallées alpines.



Prairies agricoles ni traitées ni amendées, talus des chemins et des routes, bois clairs, landes.



Ses parties aériennes sèches parfument les liqueurs, sirops, crèmes anglaises ou glaces, mais aussi les cales des bateaux.



Attention au séchage de la plante : moisie, elle devient toxique !





Grande Berce, *Heracleum spondylium*  
Kegid-moc'h, Talbod, (Apiacées)



Europe et Asie jusqu'à 2200 m d'altitude.



Friches, bocages, bords de routes et de chemins.  
En grand nombre : indique un engorgement en matière organique de mauvaise qualité (purins, lisier).



Tonique général et aphrodisiaque dans toutes ses parties.



Peut provoquer des brûlures au second degré (contact de la sève avec la peau).



Ne pas confondre avec la Berce du Caucase, allergène et toxique, qui est géante (2 à 4 m de hauteur avec des ombelles d'1 m de diamètre).



*Plantain lancéolé, Plantago lanceolata*

*Grand plantain, Plantago major*

**Sklanvach, Pemp-rouden, Stankerez ar gwad**

(Plantaginacées)



Europe et Asie



Omniprésent dans les pelouses, jardins potagers, bords de routes et de chemins.



Feuilles utilisées pour soulager les piqûres d'orties et d'insectes.

Elles peuvent protéger des allergies et libérer les voies respiratoires.



*Plantain lancéolé*



*Grand plantain*

Surnommée « White man's footprint », (l'empreinte de l'homme blanc), par les populations indigènes d'Amérique, la présence du grand plantain marquait les terres foulées par les européens.

Les plantains colonisent très vite les milieux difficiles à vivre (plantes pionnières), par autofécondation (autogame et auto-compatible), par reproduction non sexuée (un morceau de la rosette de feuilles peut se ré-enraciner) et bien d'autres stratégies encore...

Ils sont également très riches en protéines, minéraux et vitamines.



## Plantain corne-de-cerf

*Plantago coronopus*

**Troad-bran**

(Plantaginacées)



Europe centrale



Lieux secs et piétinés, sableux et pierreux dans les communes littorales surtout.



Les jeunes feuilles et épis peuvent agrémenter un mesclun (goût de champignon).





## Crépide verdâtre

*Crepis capillaris*, (Astéracées)



Europe



Trottoirs sur sol légèrement salé,  
chemins et bords de routes.



Les feuilles se consomment de mars à juin  
en salade. Les faire tremper une ou deux  
heures dans de l'eau changée plusieurs fois  
pour ôter leur amertume.





Ravenelle maritime, *Raphanus raphanistrum*

Alc'hwezen-mor, Elfezenn (Brassicacées)



Région Méditerranéenne et Asie



Bords de chemins, parkings, friches et décombres sur sol sablonneux dans les communes littorales surtout.



Toutes les parties jeunes des ravenelles (maritime ou commune) se consomment crues ou cuites comme du chou kale ou des brocolis.

Coquelicot, *Papaver rhoeas*

Rozaer, Roz ki, (Papaveracées)




Europe





Plante des cultures céréalières (messicole), friches urbaines, talus routiers et ferroviaires, interstices urbaines.



Plante du sommeil, calmante de la toux en tisanes et sirops.



# NOTES :





## Pensez à végétaliser

En bordure de murs ou ailleurs, lutter manuellement contre les herbes sauvages s'avère fastidieux, sans fin et souvent vain, car les plantes s'installeront toujours dans des espaces laissés libres.

On peut choisir de composer avec ces plantes sauvages en semant, plantant des espèces vivaces adaptées. Pissenlit et laiteron, espèces pionnières importantes pour améliorer le sol, seront ainsi parfaitement intégrés dans un mélange de végétaux entre la campanule, l'erigeron, la digitale ou encore les roses trémières...

Le choix est large et vous trouverez forcément les végétaux qui conviennent, notamment via la marque « Végétal Local » du Massif Armoricain, spécialisée pour préserver la diversité génétique des plantes (herbacées, arbustes, arbres) et leur adaptation au territoire.



## Contacts

Syndicat des Eaux du Bas-Léon  
2 route de Pen ar Guear  
29260 KERNILIS

02 98 30 75 27

[www.syndicateauxbasleon.bzh](http://www.syndicateauxbasleon.bzh)



COPFINANÇÉ PAR  
UNION EUROPÉENNE



L'Europe s'engage  
en Bretagne /

